




DOLOR

DOLOR FÍSICO EN LA VIDA COTIDIANA DE MEXICANOS

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿Qué tan frecuente cree que se presente el dolor físico en la vida cotidiana de los mexicanos?



		MUY FRECUENTE	ALGO FRECUENTE	POCO FRECUENTE	NS/NC
SEXO	MASCULINO	44.6%	35.5%	15.5%	4.4%
	FEMENINO	57.9%	27.2%	11.2%	3.7%


DOLOR FÍSICO EN LA VIDA COTIDIANA DE MEXICANOS

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿Qué tan frecuente cree que se presente el dolor físico en la vida cotidiana de los mexicanos?

		MUY FRECUENTE	ALGO FRECUENTE	POCO FRECUENTE	NS/NC
EDAD	18-24	43.2%	38.4%	16.3%	2.1%
	25-29	49.4%	34.8%	15.0%	0.8%
	30-34	61.4%	26.1%	10.4%	2.1%
	35-44	45.2%	36.3%	14.7%	3.8%
	45-54	60.1%	27.1%	11.3%	1.5%
	55- más	53.6%	24.0%	11.3%	11.1%
OCUPACIÓN	TRABAJA	49.7%	33.4%	13.6%	3.3%
	HOGAR	58.5%	25.7%	12.1%	3.7%
	ESTUDIO	44.0%	37.4%	15.2%	3.4%
	OTRO	49.0%	28.1%	12.0%	10.9%
	NS/NC	55.3%	30.3%	14.4%	0.0%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	31.9%	19.9%	24.8%	23.4%
	PRIMARIA	56.7%	17.8%	16.6%	8.9%
	SECUNDARIA	63.0%	25.1%	10.2%	1.7%
	PREPARATORIA	44.5%	35.4%	18.3%	1.8%
	LICENCIATURA	49.9%	37.8%	9.1%	3.2%
	POSGRADO	57.5%	22.0%	12.1%	8.4%
	NS/NC	34.3%	23.0%	9.0%	33.7%

GÉNERO QUE SOPORTA MÁS EL DOLOR

¿Quién cree que pueda soportar más el dolor, los hombres o las mujeres?



	HOMBRES	MUJERES	LOS DOS SOPORTAN IGUAL	NS/NC
MASCULINO	20.6%	64.1%	10.2%	5.1%
FEMENINO	6.6%	87.5%	4.5%	1.4%


GÉNERO QUE SOPORTA MÁS EL DOLOR

¿Quién cree que pueda soportar más el dolor, los hombres o las mujeres?

		HOMBRES	MUJERES	LOS DOS SOPORTAN IGUAL	NS/NC
EDAD	18-24	25.1%	67.7%	6.3%	0.9%
	25-29	18.5%	67.6%	9.4%	4.5%
	30-34	8.9%	80.6%	6.5%	4.0%
	35-44	9.7%	78.3%	8.6%	3.4%
	45-54	10.8%	79.9%	5.8%	3.5%
	55- más	8.9%	80.8%	6.9%	3.4%
OCUPACIÓN	TRABAJA	13.5%	73.9%	9.0%	3.6%
	HOGAR	5.8%	87.4%	4.0%	2.8%
	ESTUDIO	26.8%	64.3%	6.6%	2.3%
	OTRO	18.9%	70.1%	7.2%	3.8%
	NS/NC	0.0%	69.7%	30.3%	0.0%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	0.0%	90.3%	0.0%	9.7%
	PRIMARIA	9.7%	78.6%	7.3%	4.4%
	SECUNDARIA	15.2%	75.7%	5.1%	4.0%
	PREPARATORIA	14.9%	74.3%	7.4%	3.4%
	LICENCIATURA	14.5%	75.0%	8.3%	2.2%
	POSGRADO	0.0%	88.9%	11.1%	0.0%
	NS/NC	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%

DOLOR FRECUENTE

Ahora dígame, ¿Usted tiene algún dolor frecuente?




SEXO		sí	NO	NS/NC
	MASCULINO	29.4%	70.2%	0.4%
	FEMENINO	36.1%	63.1%	0.8%

Ahora dígame, ¿Usted tiene algún dolor frecuente?

		SÍ	NO	NS/NC
EDAD	18-24	17.0%	81.3%	1.7%
	25-29	32.6%	66.8%	0.6%
	30-34	28.1%	71.1%	0.8%
	35-44	32.3%	67.7%	0.0%
	45-54	49.7%	50.3%	0.0%
	55- más	36.4%	63.0%	0.6%
OCUPACIÓN	TRABAJA	32.8%	66.5%	0.7%
	HOGAR	39.7%	59.9%	0.4%
	ESTUDIO	15.2%	84.8%	0.0%
	OTRO	36.7%	61.9%	1.4%
	NS/NC	29.5%	70.5%	0.0%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	57.4%	42.6%	0.0%
	PRIMARIA	46.5%	52.8%	0.7%
	SECUNDARIA	37.5%	61.8%	0.7%
	PREPARATORIA	33.2%	65.9%	0.9%
	LICENCIATURA	24.2%	75.4%	0.4%
	POSGRADO	23.9%	76.1%	0.0%
	NS/NC	12.5%	87.5%	0.0%

APARICIÓN DE DOLOR FRECUENTE

¿Qué tan seguido aparece ese dolor?*



SEXO	¿Qué tan seguido aparece ese dolor?*		
	DE FORMA ESPORÁDICA (VA Y VIENE)	A DIARIO	NS/NC
MASCULINO	63.7%	34.7%	1.6%
FEMENINO	53.1%	46.2%	0.7%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí tienen un dolor frecuente

APARICIÓN DE DOLOR FRECUENTE


¿Qué tan seguido aparece ese dolor?*

		A DIARIO	DE FORMA ESPORÁDICA (VA Y VIENE)	NS/NC
EDAD	18-24	27.8%	72.2%	0.0%
	25-29	33.1%	66.9%	0.0%
	30-34	33.2%	64.6%	2.2%
	35-44	30.1%	68.6%	1.3%
	45-54	52.5%	47.5%	0.0%
	55- más	52.5%	45.0%	2.5%
OCUPACIÓN	TRABAJA	36.1%	62.8%	1.1%
	HOGAR	48.1%	50.3%	1.6%
	ESTUDIO	25.6%	74.4%	0.0%
	OTRO	49.3%	50.7%	0.0%
	NS/NC	67.1%	32.9%	0.0%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	26.4%	73.6%	0.0%
	PRIMARIA	55.2%	42.4%	2.4%
	SECUNDARIA	45.7%	54.3%	0.0%
	PREPARATORIA	33.2%	66.8%	0.0%
	LICENCIATURA	33.5%	64.5%	2.0%
	POSGRADO	47.4%	52.6%	0.0%
	NS/NC	100.0%	0.0%	0.0%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí tienen un dolor frecuente

TIEMPO DESDE QUE
APARECIÓ DOLOR

¿Desde cuándo apareció ese dolor?*



		HACE MENOS DE UN MES	HACE MÁS DE UN MES	HACE MÁS DE DOS MESES	HACE MÁS DE SEIS MESES	HACE MÁS DE UN AÑO	NS/NC
SEXO	MASCULINO	6.3%	3.1%	7.3%	10.3%	67.3%	5.7%
	FEMENINO	5.1%	9.5%	3.1%	9.0%	72.8%	0.5%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí tienen un dolor frecuente

TIEMPO DESDE QUE APARECIÓ DOLOR


¿Desde cuándo apareció ese dolor?*

		HACE MENOS DE UN MES	HACE MÁS DE UN MES	HACE MÁS DE DOS MESES	HACE MÁS DE SEIS MESES	HACE MÁS DE UN AÑO	NS/NC
EDAD	18-24	16.9%	2.6%	4.8%	18.2%	57.5%	0.0%
	25-29	6.2%	6.4%	2.9%	7.4%	77.1%	0.0%
	30-34	8.4%	19.0%	0.0%	14.6%	58.0%	0.0%
	35-44	5.3%	5.3%	13.0%	8.2%	66.9%	1.3%
	45-54	3.1%	8.9%	1.7%	10.1%	69.2%	7.0%
	55- más	2.8%	2.0%	4.1%	5.9%	82.0%	3.2%
OCUPACIÓN	TRABAJA	4.6%	4.4%	6.2%	13.3%	67.1%	4.4%
	HOGAR	5.5%	13.1%	4.1%	4.6%	72.7%	0.0%
	ESTUDIO	14.8%	0.0%	7.2%	12.6%	65.4%	0.0%
	OTRO	6.4%	0.0%	0.0%	7.6%	80.5%	5.5%
	NS/NC	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	0.0%	8.9%	0.0%	10.8%	54.2%	26.1%
	PRIMARIA	1.1%	7.2%	4.5%	8.9%	77.1%	1.2%
	SECUNDARIA	6.3%	4.0%	4.9%	4.1%	79.5%	1.2%
	PREPARATORIA	11.4%	13.9%	7.8%	10.0%	56.8%	0.1%
	LICENCIATURA	4.1%	1.1%	3.0%	13.4%	72.1%	6.3%
	POSGRADO	0.0%	0.0%	0.0%	16.4%	83.6%	0.0%
	NS/NC	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí tienen un dolor frecuente

LUGAR DEL CUERPO DONDE TIENE DOLOR

*Y, ¿En dónde experimenta este dolor?**



*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí tienen un dolor frecuente

LUGAR DEL CUERPO
DONDE TIENE DOLOR

Y, ¿En dónde experimenta este dolor?*

		CABEZA	ESPALDA	RODILLAS	CADERA	ESTÓ-MAGO	PIERNAS	PIES	COXIS	HOM-BROS	BRAZOS	MANOS	TOBILLOS	PECHO	OJOS	CODOS	OÍDO	OTRO
SEXO	MASCULINO	19.2%	19.4%	8.9%	9.8%	5.3%	6.8%	3.2%	5.0%	1.9%	3.5%	0.7%	1.6%	1.2%	1.2%	0.4%	0.0%	11.9%
	FEMENINO	26.6%	24.5%	11.5%	4.4%	6.5%	3.4%	4.4%	0.7%	2.0%	0.7%	2.0%	0.5%	0.3%	0.0%	0.6%	0.5%	11.4%
EDAD	18-24	38.5%	19.7%	0.0%	6.8%	13.2%	0.0%	6.9%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.8%
	25-29	38.8%	25.6%	2.4%	4.5%	11.5%	3.1%	0.0%	1.6%	2.1%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	6.3%
	30-34	33.5%	25.5%	0.0%	15.0%	7.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	0.0%	5.5%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%
	35-44	25.4%	26.7%	15.0%	7.6%	1.3%	2.5%	3.8%	0.0%	0.0%	6.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.3%
	45-54	14.1%	22.8%	18.1%	5.7%	3.6%	6.8%	5.6%	0.0%	2.2%	1.1%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	16.1%
	55- más	12.6%	15.7%	11.0%	4.5%	6.2%	10.1%	4.9%	9.4%	3.8%	1.7%	0.7%	1.3%	3.0%	2.3%	0.0%	0.0%	12.8%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí tienen un dolor frecuente

LUGAR DEL CUERPO
DONDE TIENE DOLOR

Y, ¿En dónde experimenta este dolor?*

OCUPACIÓN		CABEZA	ESPALDA	RODILLAS	CADERA	ESTÓ-MAGO	PIERNAS	PIES	COXIS	HOM-BROS	BRAZOS	MANOS	TOBILLOS	PECHO	OJOS	CODOS	OÍDO	OTRO
	TRABAJA	23.9%	30.3%	9.4%	7.8%	3.9%	4.1%	1.6%	0.0%	1.6%	3.1%	0.6%	1.4%	0.0%	0.0%	1.1%	0.5%	10.7%
	HOGAR	21.0%	17.9%	13.3%	5.2%	7.6%	6.3%	7.1%	1.1%	2.0%	1.2%	3.3%	0.9%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	11.9%
	ESTUDIO	41.7%	6.9%	4.6%	10.1%	8.9%	0.0%	10.2%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.5%
	OTRO	15.6%	8.3%	6.3%	5.3%	9.5%	7.0%	0.0%	20.7%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	5.5%	0.0%	0.0%	14.1%
	NS/NC	58.8%	0.0%	41.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	15.6%	0.0%	10.8%	0.0%	15.6%	0.0%	0.0%	0.0%	23.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.9%	26.0%	0.0%	0.0%	0.1%
	PRIMARIA	15.3%	18.5%	17.6%	6.6%	2.5%	4.0%	7.8%	9.4%	1.8%	2.8%	2.5%	1.3%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%
	SECUNDARIA	27.9%	21.2%	9.4%	3.8%	9.8%	6.2%	3.6%	0.0%	2.8%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	12.1%
	PREPARATORIA	26.8%	28.9%	3.9%	5.4%	6.2%	5.0%	3.2%	0.7%	0.9%	2.2%	1.1%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.2%
	LICENCIATURA	23.1%	21.2%	12.3%	11.4%	6.0%	4.4%	2.0%	0.7%	1.1%	1.5%	2.2%	1.0%	0.0%	0.0%	0.7%	1.0%	11.4%
	POSGRADO	30.7%	35.8%	0.0%	0.0%	0.0%	16.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%
	NS/NC	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí tienen un dolor frecuente

DOLOR/ASPECTOS VIDA COTIDIANA

¿Qué tanto considera que un dolor común (dolor de cabeza, malestar estomacal, un golpe leve) pueda afectar en los siguientes aspectos de la vida cotidiana? ¿Mucho, algo, poco o nada?

MUCHO

ALGO

POCO

NADA

NS/NC

	MUCHO	ALGO	POCO	NADA	NS/NC
ACTIVIDADES GENERALES (TRASLADOS, RUTINAS, EJERCICIO)	36.4%	32.0%	21.8%	7.5%	2.3%
ESTADO DE ÁNIMO	44.2%	27.4%	20.2%	6.4%	1.8%
PARARSE O SENTARSE	22.7%	28.7%	31.7%	14.7%	2.2%
CAMINAR	25.3%	27.6%	29.0%	16.3%	1.8%
RELACIONES CON OTRAS PERSONAS	21.4%	25.1%	32.1%	18.1%	3.3%
TRABAJO	37.6%	27.5%	25.2%	8.1%	1.6%
SUEÑO	33.2%	20.3%	28.0%	17.0%	1.5%

DOLOR/ASPECTOS VIDA COTIDIANA

¿Qué tanto considera que un dolor común (dolor de cabeza, malestar estomacal, un golpe leve) pueda afectar en los siguientes aspectos de la vida cotidiana? ¿Mucho, algo, poco o nada?

ACTIVIDADES GENERALES (TRASLADOS, RUTINAS, EJERCICIO)

		MUCHO	ALGO	POCO	NADA	NS/NC
SEXO	MASCULINO	31.8%	35.5%	21.3%	8.7%	2.7%
	FEMENINO	40.6%	28.7%	22.3%	6.4%	2.0%
EDAD	18-24	31.3%	39.2%	25.3%	3.7%	0.5%
	25-29	32.9%	41.6%	17.2%	7.1%	1.2%
	30-34	37.5%	32.0%	23.4%	6.2%	0.9%
	35-44	31.2%	35.9%	22.9%	7.9%	2.1%
	45-54	39.3%	29.1%	19.9%	10.7%	1.0%
	55- más	45.2%	18.6%	21.0%	8.7%	6.5%
OCUPACIÓN	TRABAJA	32.5%	36.7%	22.9%	6.1%	1.8%
	HOGAR	43.9%	27.1%	19.4%	7.6%	2.0%
	ESTUDIO	34.7%	30.6%	27.0%	6.4%	1.3%
	OTRO	36.4%	26.1%	14.3%	17.6%	5.6%
	NS/NC	29.5%	0.0%	44.7%	0.0%	25.8%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	58.0%	5.1%	19.9%	16.9%	0.1%
	PRIMARIA	40.2%	21.2%	21.7%	10.9%	6.0%
	SECUNDARIA	42.6%	27.4%	19.8%	7.6%	2.6%
	PREPARATORIA	31.8%	32.5%	27.9%	6.9%	0.9%
	LICENCIATURA	35.2%	39.3%	18.7%	6.4%	0.4%
	POSGRADO	32.6%	43.5%	23.9%	0.0%	0.0%
	NS/NC	12.5%	23.0%	0.0%	9.0%	55.5%

DOLOR/ASPECTOS VIDA COTIDIANA

¿Qué tanto considera que un dolor común (dolor de cabeza, malestar estomacal, un golpe leve) pueda afectar en los siguientes aspectos de la vida cotidiana? ¿Mucho, algo, poco o nada?

ESTADO DE ÁNIMO

		MUCHO	ALGO	POCO	NADA	NS/NC
SEXO	MASCULINO	39.3%	32.6%	20.7%	5.5%	1.9%
	FEMENINO	48.7%	22.5%	19.7%	7.3%	1.8%
EDAD	18-24	48.3%	24.6%	18.5%	7.6%	1.0%
	25-29	46.1%	30.5%	20.5%	2.9%	0.0%
	30-34	43.2%	22.0%	22.0%	10.4%	2.4%
	35-44	35.7%	36.0%	22.0%	5.9%	0.4%
	45-54	38.2%	31.9%	17.8%	8.7%	3.4%
	55- más	53.5%	18.4%	20.1%	4.1%	3.9%
OCUPACIÓN	TRABAJA	41.0%	32.7%	21.7%	3.2%	1.4%
	HOGAR	47.4%	20.4%	18.7%	11.1%	2.4%
	ESTUDIO	44.0%	25.1%	22.7%	7.4%	0.8%
	OTRO	52.6%	21.4%	12.8%	8.2%	5.0%
	NS/NC	29.5%	56.1%	14.4%	0.0%	0.0%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	37.4%	6.2%	46.7%	0.0%	9.7%
	PRIMARIA	37.3%	16.2%	26.0%	15.8%	4.7%
	SECUNDARIA	42.7%	26.6%	23.0%	6.6%	1.1%
	PREPARATORIA	40.9%	31.4%	21.4%	4.3%	2.0%
	LICENCIATURA	49.3%	29.7%	16.0%	4.3%	0.7%
	POSGRADO	59.4%	36.7%	0.0%	3.9%	0.0%
	NS/NC	68.0%	32.0%	0.0%	0.0%	0.0%

DOLOR/ASPECTOS VIDA COTIDIANA

¿Qué tanto considera que un dolor común (dolor de cabeza, malestar estomacal, un golpe leve) pueda afectar en los siguientes aspectos de la vida cotidiana? ¿Mucho, algo, poco o nada?

PARARSE O SENTARSE

		MUCHO	ALGO	POCO	NADA	NS/NC
SEXO	MASCULINO	20.5%	30.9%	29.0%	16.6%	3.0%
	FEMENINO	24.7%	26.7%	34.3%	12.9%	1.4%
EDAD	18-24	8.9%	40.4%	34.0%	15.3%	1.4%
	25-29	24.8%	25.8%	35.9%	13.5%	0.0%
	30-34	19.9%	27.7%	31.4%	18.8%	2.2%
	35-44	22.1%	28.9%	28.2%	19.5%	1.3%
	45-54	21.9%	28.6%	34.3%	11.0%	4.2%
	55- más	35.6%	21.6%	29.3%	10.4%	3.1%
OCUPACIÓN	TRABAJA	21.7%	31.8%	31.7%	12.3%	2.5%
	HOGAR	26.5%	22.8%	32.4%	16.7%	1.6%
	ESTUDIO	14.5%	28.7%	36.7%	20.1%	0.0%
	OTRO	28.8%	33.2%	21.1%	11.7%	5.2%
	NS/NC	12.1%	0.0%	43.1%	44.7%	0.1%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	64.8%	0.0%	30.1%	0.0%	5.1%
	PRIMARIA	37.0%	12.1%	34.4%	14.0%	2.5%
	SECUNDARIA	24.0%	28.2%	29.6%	17.7%	0.5%
	PREPARATORIA	15.6%	31.3%	34.4%	16.3%	2.4%
	LICENCIATURA	18.3%	35.7%	30.2%	13.6%	2.2%
	POSGRADO	42.0%	24.6%	25.3%	8.0%	0.1%
	NS/NC	33.7%	23.0%	21.5%	0.0%	21.8%

DOLOR/ASPECTOS VIDA COTIDIANA

¿Qué tanto considera que un dolor común (dolor de cabeza, malestar estomacal, un golpe leve) pueda afectar en los siguientes aspectos de la vida cotidiana? ¿Mucho, algo, poco o nada?

CAMINAR

		MUCHO	ALGO	POCO	NADA	NS/NC
SEXO	MASCULINO	22.0%	31.0%	26.9%	18.1%	2.0%
	FEMENINO	28.4%	24.4%	30.9%	14.5%	1.8%
EDAD	18-24	21.3%	32.2%	33.5%	12.9%	0.1%
	25-29	28.9%	24.4%	28.7%	16.4%	1.6%
	30-34	22.2%	27.2%	29.6%	20.3%	0.7%
	35-44	18.8%	33.6%	28.8%	18.4%	0.4%
	45-54	29.2%	19.2%	32.2%	16.9%	2.5%
	55- más	31.9%	26.4%	22.9%	13.8%	5.0%
OCUPACIÓN	TRABAJA	23.4%	31.4%	28.6%	15.3%	1.3%
	HOGAR	27.7%	20.5%	30.3%	18.8%	2.7%
	ESTUDIO	21.3%	26.1%	34.8%	17.7%	0.1%
	OTRO	35.1%	34.7%	15.1%	11.2%	3.9%
	NS/NC	12.1%	0.0%	73.4%	14.4%	0.1%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	43.6%	5.1%	42.3%	8.9%	0.1%
	PRIMARIA	35.1%	13.1%	27.1%	18.8%	5.9%
	SECUNDARIA	27.8%	19.8%	26.0%	24.8%	1.6%
	PREPARATORIA	22.8%	30.9%	31.6%	13.7%	1.0%
	LICENCIATURA	19.4%	36.2%	29.3%	14.2%	0.9%
	POSGRADO	47.3%	15.8%	28.9%	8.0%	0.0%
	NS/NC	33.7%	53.7%	12.5%	0.0%	0.1%

DOLOR/ASPECTOS VIDA COTIDIANA

¿Qué tanto considera que un dolor común (dolor de cabeza, malestar estomacal, un golpe leve) pueda afectar en los siguientes aspectos de la vida cotidiana? ¿Mucho, algo, poco o nada?

RELACIONES CON OTRAS PERSONAS

		MUCHO	ALGO	POCO	NADA	NS/NC
SEXO	MASCULINO	20.1%	27.9%	33.3%	15.7%	3.0%
	FEMENINO	22.7%	22.5%	30.9%	20.5%	3.4%
EDAD	18-24	24.8%	22.5%	30.8%	20.9%	1.0%
	25-29	25.4%	32.8%	24.5%	12.9%	4.4%
	30-34	15.0%	24.3%	38.5%	19.8%	2.4%
	35-44	15.0%	28.3%	38.4%	17.5%	0.8%
	45-54	12.5%	25.8%	38.1%	20.0%	3.6%
	55- más	33.7%	19.3%	22.7%	17.3%	7.0%
OCUPACIÓN	TRABAJA	18.1%	31.4%	34.3%	13.6%	2.6%
	HOGAR	22.8%	18.3%	31.2%	23.9%	3.8%
	ESTUDIO	27.4%	20.9%	26.4%	25.3%	0.0%
	OTRO	28.0%	20.7%	26.6%	15.4%	9.3%
	NS/NC	12.1%	0.0%	87.9%	0.0%	0.0%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	19.7%	8.9%	36.9%	11.0%	23.5%
	PRIMARIA	28.6%	11.6%	28.7%	26.1%	5.0%
	SECUNDARIA	16.8%	26.4%	38.7%	15.4%	2.7%
	PREPARATORIA	22.2%	26.2%	30.6%	18.1%	2.9%
	LICENCIATURA	19.1%	29.5%	31.9%	17.1%	2.4%
	POSGRADO	31.1%	30.4%	34.4%	4.1%	0.0%
	NS/NC	33.7%	53.7%	12.5%	0.0%	0.1%

DOLOR/ASPECTOS VIDA COTIDIANA

¿Qué tanto considera que un dolor común (dolor de cabeza, malestar estomacal, un golpe leve) pueda afectar en los siguientes aspectos de la vida cotidiana? ¿Mucho, algo, poco o nada?

TRABAJO

		MUCHO	ALGO	POCO	NADA	NS/NC
SEXO	MASCULINO	33.7%	31.6%	25.6%	7.0%	2.1%
	FEMENINO	41.3%	23.6%	24.9%	9.0%	1.2%
EDAD	18-24	40.9%	26.0%	23.7%	8.4%	1.0%
	25-29	39.0%	33.4%	20.3%	7.3%	0.0%
	30-34	28.8%	27.1%	33.0%	7.1%	4.0%
	35-44	36.2%	30.2%	24.2%	9.4%	0.0%
	45-54	33.4%	30.3%	29.1%	6.7%	0.5%
	55- más	43.9%	20.4%	23.0%	8.4%	4.3%
OCUPACIÓN	TRABAJA	36.6%	31.3%	24.2%	7.0%	0.9%
	HOGAR	38.2%	24.6%	27.0%	8.8%	1.4%
	ESTUDIO	38.9%	21.3%	28.5%	11.3%	0.0%
	OTRO	38.0%	24.1%	21.8%	6.4%	9.7%
	NS/NC	55.3%	30.3%	0.0%	14.4%	0.0%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	22.0%	0.0%	47.9%	8.9%	21.2%
	PRIMARIA	41.7%	20.4%	28.0%	7.6%	2.3%
	SECUNDARIA	41.0%	18.1%	30.8%	8.9%	1.2%
	PREPARATORIA	34.6%	33.3%	23.0%	7.0%	2.1%
	LICENCIATURA	36.1%	31.1%	23.7%	8.8%	0.3%
	POSGRADO	37.2%	45.1%	7.5%	10.2%	0.0%
	NS/NC	68.0%	10.4%	9.0%	0.0%	12.6%

DOLOR/ASPECTOS VIDA COTIDIANA


¿Qué tanto considera que un dolor común (dolor de cabeza, malestar estomacal, un golpe leve) pueda afectar en los siguientes aspectos de la vida cotidiana? ¿Mucho, algo, poco o nada?

SUEÑO

		MUCHO	ALGO	POCO	NADA	NS/NC
SEXO	MASCULINO	28.8%	21.9%	32.2%	15.6%	1.5%
	FEMENINO	37.3%	18.9%	24.0%	18.3%	1.5%
EDAD	18-24	32.8%	20.9%	25.8%	19.5%	1.0%
	25-29	35.3%	23.8%	25.4%	15.5%	0.0%
	30-34	32.5%	18.0%	29.3%	19.3%	0.9%
	35-44	31.8%	25.7%	25.6%	16.0%	0.9%
	45-54	27.1%	27.0%	27.5%	18.4%	0.0%
	55- más	38.8%	8.5%	33.2%	14.7%	4.8%
OCUPACIÓN	TRABAJA	30.9%	23.0%	30.3%	15.6%	0.2%
	HOGAR	36.5%	17.6%	23.3%	20.8%	1.8%
	ESTUDIO	31.1%	21.1%	32.5%	13.9%	1.4%
	OTRO	40.0%	12.7%	20.9%	18.6%	7.8%
	NS/NC	12.1%	30.3%	57.5%	0.0%	0.1%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	45.3%	8.9%	17.2%	5.1%	23.5%
	PRIMARIA	34.5%	11.6%	29.3%	22.2%	2.4%
	SECUNDARIA	33.6%	19.8%	26.5%	18.2%	1.9%
	PREPARATORIA	28.0%	23.4%	31.5%	16.4%	0.7%
	LICENCIATURA	34.5%	22.8%	26.5%	15.7%	0.5%
	POSGRADO	47.3%	17.6%	20.8%	14.2%	0.1%
	NS/NC	55.5%	19.4%	12.5%	0.0%	12.6%

EN CASO DE DOLOR
TIEMPO QUE ESPERA
PARA
ACUDIR AL MÉDICO

En caso de tener un dolor común leve o moderado,
¿cuánto tiempo espera usted para acudir a un médico?



		MENOS DE UN DÍA	UN DÍA	2 A 6 DÍAS	UNA SEMANA	MÁS DE UNA SEMANA	NO ACUDO AL MÉDICO	NS/NC
SEXO	MASCULINO	13.6%	27.5%	23.2%	11.3%	14.1%	8.5%	1.8%
	FEMENINO	18.2%	26.8%	22.5%	12.2%	14.0%	4.8%	1.5%


EN CASO DE DOLOR
TIEMPO QUE ESPERA
PARA
ACUDIR AL MÉDICO

En caso de tener un dolor común leve o moderado,
¿cuánto tiempo espera usted para acudir a un médico?

		MENOS DE UN DÍA	UN DÍA	2 A 6 DÍAS	UNA SEMANA	MÁS DE UNA SEMANA	NO ACUDO AL MÉDICO	NS/NC
EDAD	18-24	12.7%	39.7%	25.9%	8.7%	8.6%	4.0%	0.4%
	25-29	9.8%	25.8%	26.7%	15.2%	18.7%	3.8%	0.0%
	30-34	20.0%	20.9%	27.8%	14.5%	13.8%	2.3%	0.7%
	35-44	13.2%	31.3%	23.1%	10.7%	16.7%	4.0%	1.0%
	45-54	20.8%	23.9%	19.0%	12.1%	8.9%	13.6%	1.7%
	55- más	19.2%	19.6%	17.8%	11.6%	17.1%	10.2%	4.5%
OCUPACIÓN	TRABAJA	15.5%	25.7%	23.0%	11.4%	15.5%	7.5%	1.4%
	HOGAR	17.2%	28.4%	20.3%	14.6%	11.6%	5.8%	2.1%
	ESTUDIO	11.0%	38.2%	27.1%	10.4%	10.6%	2.7%	0.0%
	OTRO	23.6%	15.7%	24.1%	7.5%	16.5%	9.4%	3.2%
	NS/NC	0.0%	12.1%	25.8%	0.0%	47.6%	14.4%	0.1%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	30.5%	26.1%	0.0%	0.0%	19.5%	8.9%	15.0%
	PRIMARIA	7.5%	18.8%	20.1%	23.5%	14.5%	10.7%	4.9%
	SECUNDARIA	20.1%	36.4%	19.3%	7.7%	9.4%	6.0%	1.1%
	PREPARATORIA	20.6%	28.2%	18.4%	12.1%	13.8%	6.5%	0.4%
	LICENCIATURA	12.9%	26.6%	29.3%	9.5%	15.9%	5.3%	0.5%
	POSGRADO	24.5%	13.2%	39.4%	0.0%	18.0%	0.0%	4.9%
	NS/NC	33.7%	34.3%	10.4%	0.0%	12.5%	9.0%	0.1%

EN CASO DE DOLOR- ANALGÉSICO

En caso de padecer de algún dolor, ¿usa algún analgésico?



		sí	NO	NS/NC
SEXO	MASCULINO	68.7%	31.2%	0.1%
	FEMENINO	70.5%	28.1%	1.4%


EN CASO DE DOLOR- ANALGÉSICO

En caso de padecer de algún dolor, ¿usa algún analgésico?

		SÍ	NO	NS/NC
EDAD	18-24	67.6%	30.4%	2.0%
	25-29	75.1%	24.9%	0.0%
	30-34	71.7%	26.5%	1.8%
	35-44	72.3%	27.7%	0.0%
	45-54	62.9%	36.0%	1.1%
	55- más	69.1%	30.5%	0.4%
OCUPACIÓN	TRABAJA	70.8%	28.7%	0.5%
	HOGAR	70.0%	29.4%	0.6%
	ESTUDIO	68.5%	29.0%	2.5%
	OTRO	64.9%	35.1%	0.0%
	NS/NC	43.1%	44.7%	12.2%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	81.4%	18.6%	0.0%
	PRIMARIA	65.1%	33.8%	1.1%
	SECUNDARIA	69.5%	28.7%	1.8%
	PREPARATORIA	68.3%	31.7%	0.0%
	LICENCIATURA	71.9%	27.2%	0.9%
	POSGRADO	71.5%	28.5%	0.0%
	NS/NC	77.0%	23.0%	0.0%

ANALGÉSICO QUE USA

¿Qué analgésico usa?*



		PARACETAMOL	ASPIRINA	DICLOFENACO	KETOROLACO	IBUPROFENO	ACETAMINOFENO	OTRO	NS/NC
SEXO	MASCULINO	37.2%	26.5%	15.0%	6.1%	3.8%	0.0%	10.3%	1.1%
	FEMENINO	50.5%	15.4%	13.8%	5.3%	4.3%	0.4%	8.0%	2.3%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí usan un analgésico en caso de dolor

ANALGÉSICO QUE
USA


¿Qué analgésico usa?*

		PARACETAMOL	ASPIRINA	DICLOFENACO	KETOROLACO	IBUPROFENO	ACETAMINOFENO	OTRO	NS/NC
EDAD	18-24	40.6%	25.2%	16.9%	3.6%	4.4%	0.0%	7.8%	1.5%
	25-29	40.3%	26.8%	11.3%	9.6%	2.5%	0.0%	5.6%	3.9%
	30-34	59.8%	15.5%	5.7%	10.8%	2.0%	0.0%	6.2%	0.0%
	35-44	46.4%	22.8%	10.3%	4.2%	8.9%	0.6%	5.1%	1.7%
	45-54	45.1%	19.8%	14.8%	4.5%	1.2%	0.6%	14.0%	0.0%
	55- más	37.0%	14.8%	23.8%	4.1%	2.9%	0.0%	15.1%	2.3%
OCUPACIÓN	TRABAJA	24.5%	44.6%	4.8%	11.3%	0.3%	5.6%	7.5%	1.4%
	HOGAR	11.7%	54.0%	2.9%	15.1%	0.3%	5.0%	8.8%	2.2%
	ESTUDIO	27.6%	34.7%	3.5%	20.4%	0.0%	5.5%	7.5%	0.8%
	OTRO	20.3%	20.2%	4.8%	19.2%	0.0%	9.5%	22.9%	3.1%
	NS/NC	0.0%	40.2%	0.0%	59.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	18.6%	49.1%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	7.6%	18.4%
	PRIMARIA	17.4%	34.9%	1.7%	22.4%	0.6%	3.0%	19.2%	0.8%
	SECUNDARIA	23.8%	47.0%	1.7%	13.9%	0.0%	8.4%	5.1%	0.1%
	PREPARATORIA	22.3%	46.1%	3.9%	12.5%	0.5%	6.3%	6.0%	2.4%
	LICENCIATURA	19.2%	45.1%	5.8%	13.7%	0.0%	5.2%	9.2%	1.8%
	POSGRADO	39.8%	18.8%	17.0%	7.7%	0.0%	5.7%	11.0%	0.0%
	NS/NC	0.0%	88.4%	0.0%	0.0%	0.0%	11.6%	0.0%	0.0%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí usan un analgésico en caso de dolor

MARCA DE ANALGÉSICO QUE USA

*Y ¿Cuál es la marca de analgésico que usted usa?**



*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí usan un analgésico en caso de dolor

MARCA DE ANALGÉSICO QUE USA

Y ¿Cuál es la marca de analgésico que usted usa?*

		TYLENOL	PANADOL	WINASORB	TEMPRA	ADVIL	TABALÓN	CATAFLA M	VOLTAREN	ANALGEN	SEDALMER CK	MEDICAME NTO GENÉRICO	ASPIRIN A BAYER	OTRO	NS/NC
SEXO	MASCULINO	3.8%	5.5%	0.0%	15.2%	2.8%	0.8%	0.6%	4.4%	1.2%	8.6%	31.5%	5.6%	7.5%	12.5%
	FEMENINO	4.3%	0.6%	0.6%	16.0%	3.2%	0.2%	0.2%	3.1%	1.7%	7.9%	39.0%	4.0%	8.3%	10.9%
EDAD	18-24	3.1%	1.8%	0.7%	27.1%	9.9%	0.0%	0.0%	5.4%	1.4%	11.0%	18.9%	2.2%	4.2%	14.3%
	25-29	2.3%	1.3%	0.0%	19.9%	3.6%	0.0%	1.3%	3.4%	2.2%	12.0%	32.1%	6.9%	4.1%	10.9%
	30-34	1.3%	0.9%	0.0%	18.9%	2.5%	0.0%	1.1%	3.3%	2.1%	7.5%	39.1%	2.2%	14.3%	6.8%
	35-44	9.1%	2.5%	0.9%	10.9%	1.9%	0.6%	0.5%	4.3%	2.0%	11.3%	36.1%	3.9%	6.5%	9.5%
	45-54	5.1%	5.2%	0.0%	10.8%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	1.6%	6.7%	43.8%	10.1%	7.2%	6.5%
	55- más	1.5%	5.0%	0.0%	10.2%	0.7%	1.6%	0.0%	2.8%	0.0%	1.5%	42.1%	4.0%	11.6%	19.0%
OCUPACIÓN	TRABAJA	4.6%	3.7%	0.0%	17.2%	3.4%	0.7%	0.9%	3.6%	1.4%	9.7%	33.0%	5.2%	6.1%	10.5%
	HOGAR	5.2%	1.0%	0.7%	12.8%	1.0%	0.3%	0.0%	2.9%	1.4%	6.8%	44.0%	4.8%	10.0%	9.1%
	ESTUDIO	2.0%	2.4%	0.9%	24.5%	6.3%	0.0%	0.0%	8.4%	0.9%	9.2%	17.5%	3.4%	4.1%	20.4%
	OTRO	0.0%	6.5%	0.0%	3.1%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	2.6%	49.5%	4.2%	18.7%	9.5%
	NS/NC	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí usan un analgésico en caso de dolor

MARCA DE ANALGÉSICO QUE USA


Y ¿Cuál es la marca de analgésico que usted usa?*

ESCOLARIDAD		TYLENOL	PANADOL	WINASORB	TEMPRA	ADVIL	TABALÓN	CATAFLAM	VOLTAREN	ANALGEN	SEDALMER CK	MEDICAMENTO GENÉRICO	ASPIRINA BAYER	OTRO	NS/NC
	SIN ESCOLARIDAD	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	11.0%	28.8%	0.0%	7.6%	46.3%
	PRIMARIA	0.9%	9.1%	0.0%	8.8%	0.0%	1.6%	0.0%	2.9%	0.6%	5.4%	37.6%	7.8%	12.7%	12.6%
	SECUNDARIA	2.5%	5.0%	0.0%	17.3%	2.4%	0.0%	0.0%	1.7%	3.2%	13.7%	33.7%	2.8%	11.4%	6.3%
	PREPARATORIA	3.1%	2.7%	0.4%	17.0%	1.5%	0.0%	0.5%	2.4%	1.6%	8.7%	40.8%	7.5%	4.1%	9.7%
	LICENCIATURA	6.4%	0.0%	0.6%	17.3%	5.9%	0.4%	0.8%	6.3%	1.2%	6.8%	31.8%	2.9%	6.4%	13.2%
	POSGRADO	8.7%	0.0%	0.0%	10.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	31.3%	0.0%	21.7%	22.3%
	NS/NC	0.0%	0.0%	0.0%	28.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	43.8%	0.0%	11.6%	16.4%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí usan un analgésico en caso de dolor

INFORMACIÓN/
TRATAMIENTOS PARA
EL DOLOR

¿Dónde buscaría usted información para encontrar
tratamientos para el dolor?



INFORMACIÓN/
TRATAMIENTOS PARA
EL DOLOR

¿Dónde buscaría usted información para encontrar
tratamientos para el dolor?

EDAD

	CONSULTANDO A UN MÉDICO	EN INTERNET	EN UNA FARMACIA	ACUDIENDO A UN CENTRO DE SALUD	CONSULTANDO AMIGOS O FAMILIARES	EN LIBROS O REVISTAS	EN TELEVISIÓN O RADIO	OTRO	NS/NC
18-24	61.0%	14.8%	10.1%	5.7%	4.7%	1.0%	0.4%	2.3%	0.0%
25-29	53.8%	17.6%	15.1%	5.6%	2.7%	2.5%	0.0%	2.6%	0.1%
30-34	63.9%	10.9%	11.4%	8.0%	4.4%	0.0%	0.7%	0.7%	0.0%
35-44	64.5%	10.4%	9.9%	9.4%	3.9%	0.0%	0.5%	0.9%	0.5%
45-54	63.2%	9.9%	8.5%	7.5%	5.4%	0.5%	0.8%	4.2%	0.0%
55- más	61.3%	5.5%	7.1%	13.7%	2.3%	0.9%	0.9%	4.8%	3.5%

OCUPACIÓN


TRABAJA	63.3%	5.7%	9.4%	4.6%	13.4%	0.9%	0.0%	1.8%	0.9%
HOGAR	61.0%	14.0%	9.8%	3.2%	7.4%	0.4%	1.4%	2.3%	0.5%
ESTUDIO	64.6%	3.1%	12.8%	3.0%	11.3%	1.5%	0.5%	3.2%	0.0%
OTRO	50.7%	17.3%	10.3%	3.0%	6.4%	0.0%	1.5%	8.9%	1.9%
NS/NC	47.6%	0.0%	0.0%	0.0%	52.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

ESCOLARIDAD

SIN ESCOLARIDAD	65.1%	11.0%	8.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%
PRIMARIA	53.2%	21.3%	8.8%	3.0%	6.9%	0.0%	0.0%	6.3%	0.5%
SECUNDARIA	61.9%	10.0%	16.6%	4.9%	1.8%	0.0%	1.5%	2.5%	0.8%
PREPARATORIA	62.5%	5.4%	12.1%	5.3%	11.9%	1.1%	0.3%	1.4%	0.0%
LICENCIATURA	64.1%	5.0%	5.5%	2.9%	17.0%	1.3%	0.7%	2.4%	1.1%
POSGRADO	65.5%	0.0%	19.2%	3.7%	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
NS/NC	68.0%	23.0%	0.0%	0.0%	9.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

DOLOR CRÓNICO

Dolor crónico es aquel que dura más de tres meses. ¿Usted padece o ha padecido de dolor crónico?



		sí	NO
SEXO	MASCULINO	16.0%	84.0%
	FEMENINO	23.0%	77.0%


DOLOR CRÓNICO

Dolor crónico es aquel que dura más de tres meses. ¿Usted padece o ha padecido de dolor crónico?

		SÍ	NO
EDAD	18-24	4.5%	95.5%
	25-29	12.2%	87.8%
	30-34	13.6%	86.4%
	35-44	17.3%	82.7%
	45-54	29.8%	70.2%
	55- más	34.3%	65.7%
OCUPACIÓN	TRABAJA	19.5%	80.5%
	HOGAR	24.8%	75.2%
	ESTUDIO	1.8%	98.2%
	OTRO	28.0%	72.0%
	NS/NC	29.5%	70.5%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	39.5%	60.5%
	PRIMARIA	31.7%	68.3%
	SECUNDARIA	22.4%	77.6%
	PREPARATORIA	16.1%	83.9%
	LICENCIATURA	14.3%	85.7%
	POSGRADO	27.4%	72.6%
	NS/NC	12.5%	87.5%

CONOCIDO-DOLOR CRÓNICO

¿Usted conoce a alguien que haya padecido de dolor crónico?



		sí	NO	NS/NC
SEXO	MASCULINO	26.1%	73.0%	0.9%
	FEMENINO	23.4%	75.5%	1.1%


CONOCIDO-DOLOR CRÓNICO

¿Usted conoce a alguien que haya padecido de dolor crónico?

		SÍ	NO	NS/NC
EDAD	18-24	25.6%	73.0%	1.4%
	25-29	22.3%	77.7%	0.0%
	30-34	18.2%	81.8%	0.0%
	35-44	26.5%	73.5%	0.0%
	45-54	25.1%	73.7%	1.2%
	55- más	28.4%	68.3%	3.3%
OCUPACIÓN	TRABAJA	27.6%	71.5%	0.9%
	HOGAR	16.6%	82.5%	0.9%
	ESTUDIO	26.5%	73.5%	0.0%
	OTRO	30.3%	66.0%	3.7%
	NS/NC	57.0%	43.0%	0.0%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	0.0%	100.0%	0.0%
	PRIMARIA	9.6%	89.8%	0.6%
	SECUNDARIA	20.1%	79.3%	0.6%
	PREPARATORIA	26.6%	72.8%	0.6%
	LICENCIATURA	30.8%	68.5%	0.7%
	POSGRADO	39.4%	60.6%	0.0%
	NS/NC	24.8%	36.6%	38.6%

TIEMPO DE DOLOR
CRÓNICO

¿Durante cuánto ha presentado dolor, usted o su familiar o conocido?*



		DE 3 A 6 MESES	DE 6 MESES A UN AÑO	DE UN AÑO A DOS AÑOS	MÁS DE DOS AÑOS	NS/NC
SEXO	MASCULINO	34.7%	16.2%	13.4%	29.3%	6.4%
	FEMENINO	26.3%	12.1%	11.5%	43.1%	7.0%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí han padecido o tienen conocidos con dolor crónico

TIEMPO DE DOLOR CRÓNICO


*¿Durante cuánto ha presentado dolor, usted o su familiar o conocido?**

		DE 3 A 6 MESES	DE 6 MESES A UN AÑO	DE UN AÑO A DOS AÑOS	MÁS DE DOS AÑOS	NS/NC
EDAD	18-24	29.9%	22.8%	16.0%	21.6%	9.7%
	25-29	25.2%	15.5%	19.5%	37.6%	2.2%
	30-34	41.0%	13.2%	16.0%	29.7%	0.1%
	35-44	33.8%	19.0%	8.9%	36.1%	2.2%
	45-54	25.9%	10.0%	16.2%	43.9%	4.0%
	55- más	28.8%	8.7%	6.8%	40.9%	14.8%
OCUPACIÓN	TRABAJA	36.6%	14.3%	15.0%	28.7%	5.4%
	HOGAR	26.2%	8.2%	2.9%	55.5%	7.2%
	ESTUDIO	18.7%	25.5%	24.0%	29.7%	2.1%
	OTRO	19.9%	19.3%	9.4%	34.7%	16.7%
	NS/NC	24.9%	0.0%	54.4%	20.7%	0.0%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	13.0%	0.0%	0.0%	33.5%	53.5%
	PRIMARIA	24.8%	7.6%	13.8%	49.5%	4.3%
	SECUNDARIA	28.2%	10.6%	8.7%	49.4%	3.1%
	PREPARATORIA	25.8%	21.2%	12.5%	29.6%	10.9%
	LICENCIATURA	39.0%	12.3%	14.4%	28.6%	5.7%
	POSGRADO	5.8%	17.9%	5.9%	70.4%	0.0%
	NS/NC	36.6%	63.4%	0.0%	0.0%	0.0%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí han padecido o tienen conocidos con dolor crónico

TRATAMIENTO PARA DOLOR CRÓNICO

*¿Usted, su familiar o conocido utilizó algún tratamiento para el dolor crónico? **



		sí	NO	NS/NC
SEXO	MASCULINO	68.5%	28.9%	2.6%
	FEMENINO	76.1%	20.1%	3.8%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí han padecido o tienen conocidos con dolor crónico

TRATAMIENTO PARA DOLOR CRÓNICO


*¿Usted, su familiar o conocido utilizó algún tratamiento para el dolor crónico? **

		SÍ	NO	NS/NC
EDAD	18-24	73.1%	19.7%	7.2%
	25-29	71.7%	22.9%	5.4%
	30-34	80.3%	19.7%	0.0%
	35-44	73.9%	23.1%	3.0%
	45-54	71.1%	28.9%	0.0%
	55- más	70.2%	25.7%	4.1%
OCUPACIÓN	TRABAJA	69.6%	28.0%	2.4%
	HOGAR	72.9%	23.8%	3.3%
	ESTUDIO	81.3%	11.2%	7.5%
	OTRO	80.8%	17.5%	1.7%
	NS/NC	54.4%	24.9%	20.7%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	0.0%	100.0%	0.0%
	PRIMARIA	70.7%	28.3%	1.0%
	SECUNDARIA	59.3%	31.7%	9.0%
	PREPARATORIA	70.6%	28.5%	0.9%
	LICENCIATURA	82.3%	13.9%	3.8%
	POSGRADO	80.0%	20.0%	0.0%
	NS/NC	63.4%	36.6%	0.0%

***Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí han padecido o tienen conocidos con dolor crónico**

TRATAMIENTO PARA DOLOR CRÓNICO

¿Usted, su familiar o conocido qué tipo de tratamiento utilizó?*



SEXO		MEDICAMENTOS O FÁRMACOS	TERAPIA FÍSICA (MASAJES, CALOR, ETC.)	MEDICINA ALTERNATIVA (ACUPUNTURA, HOMEOPATÍA, ETC.)	TODAS	OTRO	NS/NC
	MASCULINO	70.2%	13.2%	13.0%	0.0%	0.0%	3.6%
	FEMENINO	55.7%	23.4%	12.7%	6.8%	0.9%	0.5%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí han padecido o tienen conocidos con dolor crónico los cuales si usaron un tratamiento

TRATAMIENTO PARA DOLOR CRÓNICO


¿Usted, su familiar o conocido qué tipo de tratamiento utilizó?*

		TERAPIA FÍSICA (MASAJES, CALOR, ETC.)	MEDICAMENTOS O FÁRMACOS	MEDICINA ALTERNATIVA (ACUPUNTURA, HOMEOPATÍA, ETC.)	TODAS	OTRO	NS/NC
EDAD	18-24	29.0%	57.1%	10.7%	0.0%	0.0%	3.2%
	25-29	4.4%	56.4%	23.6%	8.6%	1.9%	5.1%
	30-34	26.0%	71.1%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	35-44	19.7%	54.4%	19.7%	4.9%	0.0%	1.3%
	45-54	20.2%	64.6%	9.1%	4.6%	0.0%	1.5%
	55- más	18.1%	65.8%	9.2%	5.7%	1.2%	0.0%
OCUPACIÓN	TRABAJA	20.9%	59.8%	11.2%	5.4%	0.5%	2.2%
	HOGAR	19.4%	58.6%	17.0%	4.1%	0.9%	0.0%
	ESTUDIO	23.1%	66.0%	5.5%	0.0%	0.0%	5.4%
	OTRO	8.0%	72.0%	15.6%	4.4%	0.0%	0.0%
	NS/NC	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	0.0%	34.2%	65.8%	0.0%	0.0%	0.0%
	PRIMARIA	16.9%	63.8%	8.6%	9.2%	1.5%	0.0%
	SECUNDARIA	25.7%	51.4%	14.8%	5.2%	1.4%	1.5%
	PREPARATORIA	20.2%	58.8%	15.2%	4.1%	0.0%	1.7%
	LICENCIATURA	16.2%	69.2%	10.5%	1.0%	0.0%	3.1%
	POSGRADO	0.0%	87.4%	12.6%	0.0%	0.0%	0.0%
	NS/NC	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí han padecido o tienen conocidos con dolor crónico los cuales si usaron un tratamiento

CONOCIMIENTO DE TRATAMIENTO PARA DOLOR CRÓNICO

¿Dónde se enteró de la existencia de este tratamiento?*



*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí han padecido o tienen conocidos con dolor crónico los cuales si usaron un tratamiento

CONOCIMIENTO DE TRATAMIENTO PARA DOLOR CRÓNICO


¿Dónde se enteró de la existencia de este tratamiento?*

		CONSULTAN DO A UN MÉDICO	ACUDIENDO A UN CENTRO DE SALUD	CONSULTANDO A FAMILIARES O AMIGOS	EN INTERNET	EN TELEVISIÓN O RADIO	EN UNA FARMACIA	EN LIBROS O REVISTAS	OTRO	NS/NC
EDAD	18-24	68.9%	9.5%	8.7%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%	9.9%
	25-29	74.2%	9.7%	13.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.1%
	30-34	49.1%	29.0%	14.1%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	4.8%	0.0%
	35-44	70.5%	7.9%	10.5%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.8%
	45-54	43.2%	14.2%	6.0%	11.7%	4.8%	1.2%	0.0%	17.8%	1.1%
	55- más	58.4%	14.7%	11.9%	1.0%	4.0%	2.7%	0.9%	6.4%	0.0%
OCUPACIÓN	TRABAJA	52.1%	15.4%	0.8%	14.6%	1.8%	0.5%	2.9%	7.6%	4.3%
	HOGAR	69.8%	13.7%	3.4%	4.1%	8.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%
	ESTUDIO	84.1%	6.0%	0.0%	5.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.1%
	OTRO	50.6%	11.9%	2.5%	12.3%	0.0%	0.0%	4.3%	15.5%	2.9%
	NS/NC	68.0%	0.0%	0.0%	0.0%	32.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	PRIMARIA	49.2%	16.2%	6.1%	0.0%	13.7%	0.0%	3.3%	11.5%	0.0%
	SECUNDARIA	57.4%	14.5%	2.3%	18.6%	2.4%	0.0%	2.9%	1.9%	0.0%
	PREPARATORIA	62.4%	18.1%	0.0%	12.3%	1.4%	0.0%	0.0%	4.5%	1.3%
	LICENCIATURA	59.7%	10.5%	0.9%	11.6%	1.5%	0.6%	2.6%	6.4%	6.2%
	POSGRADO	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	NS/NC	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí han padecido o tienen conocidos con dolor crónico los cuales si usaron un tratamiento

PADECIMIENTO PROVOCÓ DOLOR CRÓNICO

¿A qué padecimiento se debe o se debió su dolor crónico?
*



*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí han padecido o tienen conocidos con dolor crónico

PADECIMIENTO
PROVOCÓ DOLOR
CRÓNICO

¿A qué padecimiento se debe o se debió su dolor crónico?
*

SEXO		ESTRÉS	DOLOR DE ESPALDA	ARTRITIS	MIGRAÑA	LESIONES DEPORTIVAS	CÁNCER	ALGUNA ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL	ALGUNA ENFERMEDAD RELACIONADA CON LOS DIENTES	ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	SINUSITIS	ACCIDENTE	DESGASTE	DIABETES	DOLOR DE HUESOS O ARTICULACIONES	DOLOR EN LA COLUMNA	OTRO	NS/NC
MASCULINO		8.4%	5.0%	3.6%	5.9%	6.5%	9.1%	7.1%	0.6%	1.6%	2.3%	4.6%	4.4%	5.1%	3.8%	4.1%	12.9%	15.0%
	FEMENINO	8.7%	6.1%	6.9%	9.0%	3.0%	3.9%	8.3%	0.4%	2.8%	0.0%	3.9%	7.2%	2.8%	2.8%	2.6%	15.8%	15.8%
EDAD	18-24	4.1%	10.6%	9.1%	4.1%	5.6%	10.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	1.2%	7.5%	1.4%	6.3%	15.4%	22.4%
	25-29	17.7%	2.9%	9.4%	8.0%	4.8%	0.0%	12.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	1.6%	24.3%	17.3%
	30-34	2.5%	8.0%	7.3%	2.7%	0.0%	5.1%	16.8%	0.0%	2.7%	6.9%	6.2%	6.4%	0.0%	5.6%	0.0%	10.7%	19.1%
	35-44	12.0%	4.3%	3.4%	15.4%	3.6%	5.3%	4.6%	1.3%	5.6%	1.2%	3.6%	5.0%	2.4%	1.1%	4.3%	15.8%	11.1%
	45-54	10.1%	4.0%	3.3%	4.9%	7.8%	2.4%	12.3%	0.0%	0.0%	0.0%	9.0%	4.3%	4.3%	3.6%	3.0%	9.8%	21.2%
	55- más	5.6%	5.6%	4.7%	6.4%	4.1%	10.5%	6.1%	0.7%	2.8%	0.0%	4.2%	11.1%	5.7%	5.9%	3.1%	14.0%	9.5%
OCUPACIÓN	TRABAJA	9.5%	4.6%	2.9%	7.7%	5.7%	3.4%	5.9%	0.5%	1.7%	2.1%	5.1%	4.5%	3.7%	2.9%	4.4%	16.6%	18.8%
	HOGAR	7.2%	6.6%	9.7%	8.5%	2.7%	2.2%	13.4%	0.7%	5.0%	0.0%	4.2%	9.2%	1.2%	4.8%	1.4%	10.9%	12.3%
	ESTUDIO	2.0%	11.0%	9.0%	4.3%	5.5%	14.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	10.4%	1.9%	5.3%	20.8%	11.4%
	OTRO	14.1%	3.9%	3.9%	5.3%	3.9%	24.3%	9.8%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	7.0%	4.1%	2.4%	1.5%	7.9%	7.6%
	NS/NC	0.0%	0.0%	0.0%	24.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.7%	0.0%	0.0%	17.4%	37.0%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí han padecido o tienen conocidos con dolor crónico

PADECIMIENTO
PROVOCÓ DOLOR
CRÓNICO

¿A qué padecimiento se debe o se debió su dolor crónico?
*


ESCOLARIDAD

	ESTRÉS	DOLOR DE ESPALDA	ARTRITIS	MIGRAÑA	LESIONES DEPORTIVAS	CÁNCER	ALGUNA ENFERMEDAD GASTROINTESTIN AL	ALGUNA ENFERMEDAD RELACIONADA CON LOS DIENTES	ENFERMEDADES CARDIOVASCULA RES	SINUSITIS	ACCIDENTE	DESGASTE	DIABETES	DOLOR DE HUESOS O ARTICULACIONES	DOLOR EN LA COLUMNA	OTRO	NS/NC
SIN ESCOLARIDAD	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	49.2%	13.0%
PRIMARIA	11.9%	1.7%	4.8%	4.5%	6.1%	4.2%	4.6%	1.3%	1.2%	0.0%	4.8%	13.4%	7.0%	4.1%	2.4%	5.0%	23.0%
SECUNDARIA	16.0%	7.6%	4.1%	11.7%	0.0%	1.4%	8.9%	0.0%	1.7%	0.0%	5.1%	5.3%	2.9%	2.7%	0.0%	16.7%	15.9%
PREPARATORIA	5.8%	6.9%	6.9%	7.2%	1.9%	7.3%	9.1%	1.0%	5.2%	1.8%	6.1%	1.4%	2.5%	3.2%	2.5%	16.1%	15.1%
LICENCIATURA	7.1%	6.1%	5.9%	7.6%	7.8%	9.5%	7.6%	0.0%	1.1%	1.7%	2.8%	7.0%	3.4%	3.0%	4.3%	12.8%	12.3%
POSGRADO	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.1%	0.0%	7.2%	53.0%	16.1%
NS/NC	0.0%	0.0%	0.0%	36.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	63.4%	0.0%	0.0%

*Esta pregunta se le realizó a quienes contestaron que sí han padecido o tienen conocidos con dolor crónico

DOLOR-SIN DIAGNÓSTICO

¿Usted tiene algún familiar o conocido que haya tenido dolor por varios meses y no le hayan podido diagnosticar la causa?



		sí	NO	NS/NC
SEXO	MASCULINO	15.9%	83.8%	0.3%
	FEMENINO	17.8%	81.2%	1.0%


DOLOR-SIN DIAGNÓSTICO

¿Usted tiene algún familiar o conocido que haya tenido dolor por varios meses y no le hayan podido diagnosticar la causa?

		SÍ	NO	NS/NC
EDAD	18-24	18.3%	81.7%	0.0%
	25-29	10.4%	89.6%	0.0%
	30-34	7.1%	92.9%	0.0%
	35-44	13.9%	85.3%	0.8%
	45-54	32.3%	67.1%	0.6%
	55- más	16.8%	81.7%	1.5%
OCUPACIÓN	TRABAJA	18.5%	80.9%	0.6%
	HOGAR	15.4%	83.8%	0.8%
	ESTUDIO	12.4%	87.6%	0.0%
	OTRO	20.8%	78.5%	0.7%
	NS/NC	0.0%	100.0%	0.0%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	15.9%	84.1%	0.0%
	PRIMARIA	18.9%	78.9%	2.2%
	SECUNDARIA	13.4%	85.5%	1.1%
	PREPARATORIA	17.9%	82.1%	0.0%
	LICENCIATURA	15.8%	84.0%	0.2%
	POSGRADO	45.3%	54.7%	0.0%
	NS/NC	0.0%	100.0%	0.0%

RAZÓN POR LA QUE NO ASISTE AL MÉDICO DOLOR FRECUENTE

En su opinión, ¿Por qué cree que las personas no acuden al médico cuando presentan un dolor frecuente?



SEXO		FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS	CREEN QUE SE IRÁ SOLO	FALTA DE TIEMPO	FALTA DE INFORMACIÓN	OTRO	NS/NC
	MASCULINO	45.5%	18.3%	12.0%	15.3%	8.3%	0.6%
	FEMENINO	48.7%	18.1%	13.9%	9.6%	7.8%	1.9%


RAZÓN POR LA QUE NO ASISTE AL MÉDICO DOLOR FRECUENTE

En su opinión, ¿Por qué cree que las personas no acuden al médico cuando presentan un dolor frecuente?

		FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS	CREEN QUE SE IRÁ SOLO	FALTA DE TIEMPO	FALTA DE INFORMACIÓN	OTRO	NS/NC
EDAD	18-24	29.9%	21.7%	17.4%	18.2%	11.9%	0.9%
	25-29	40.9%	24.0%	16.1%	15.9%	3.0%	0.1%
	30-34	53.4%	20.3%	8.8%	10.3%	5.0%	2.2%
	35-44	45.9%	19.6%	17.3%	10.8%	6.4%	0.0%
	45-54	52.1%	16.3%	13.1%	8.8%	6.1%	3.6%
	55- más	58.9%	10.5%	5.5%	10.9%	13.0%	1.2%
OCUPACIÓN	TRABAJA	48.5%	12.8%	12.9%	18.8%	6.6%	0.4%
	HOGAR	52.9%	11.6%	9.0%	17.1%	6.5%	2.9%
	ESTUDIO	29.9%	18.3%	15.9%	25.6%	10.2%	0.1%
	OTRO	44.7%	12.1%	14.2%	8.5%	18.1%	2.4%
	NS/NC	59.8%	0.0%	25.8%	0.0%	14.4%	0.0%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	61.8%	0.0%	23.4%	0.0%	9.7%	5.1%
	PRIMARIA	62.8%	10.4%	7.1%	10.3%	5.1%	4.3%
	SECUNDARIA	49.6%	10.3%	18.9%	17.0%	3.3%	0.9%
	PREPARATORIA	39.8%	15.0%	11.0%	21.6%	11.3%	1.3%
	LICENCIATURA	43.8%	13.9%	12.6%	20.8%	8.8%	0.1%
	POSGRADO	41.9%	26.4%	3.7%	15.6%	12.3%	0.1%
	NS/NC	68.0%	0.0%	23.0%	9.0%	0.0%	0.0%

FIBROMIALGIA

Para terminar, la fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por un dolor extendido y persistente en las articulaciones, los músculos, los tendones y otros tejidos blandos. Antes de que yo se lo mencionara, ¿usted conocía o había oído hablar de esta enfermedad?



		sí	NO	NS/NC
SEXO	MASCULINO	16.6%	83.4%	0.0%
	FEMENINO	25.2%	74.6%	0.2%

FIBROMIALGIA

Para terminar, la fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por un dolor extendido y persistente en las articulaciones, los músculos, los tendones y otros tejidos blandos. Antes de que yo se lo mencionara, ¿usted conocía o había oído hablar de esta enfermedad?

		SÍ	NO	NS/NC
EDAD	18-24	8.5%	91.5%	0.0%
	25-29	16.2%	82.8%	1.0%
	30-34	20.9%	79.1%	0.0%
	35-44	24.6%	75.4%	0.0%
	45-54	23.5%	76.5%	0.0%
	55- más	28.8%	71.2%	0.0%
OCUPACIÓN	TRABAJA	20.1%	79.9%	0.0%
	HOGAR	24.6%	74.9%	0.5%
	ESTUDIO	12.5%	87.5%	0.0%
	OTRO	24.6%	75.4%	0.0%
	NS/NC	56.1%	43.9%	0.0%
ESCOLARIDAD	SIN ESCOLARIDAD	36.8%	63.2%	0.0%
	PRIMARIA	17.0%	83.0%	0.0%
	SECUNDARIA	17.7%	81.5%	0.8%
	PREPARATORIA	15.5%	84.5%	0.0%
	LICENCIATURA	26.3%	73.7%	0.0%
	POSGRADO	59.5%	40.5%	0.0%
	NS/NC	0.0%	100.0%	0.0%

Universo

- Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y cuentan con línea telefónica en su hogar.

Técnica de levantamiento

- Encuesta telefónica realizada el 18 de Septiembre de 2013.

Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística.

- Se diseñó una muestra de 800 encuestas distribuidas, primero en proporción a la lista nominal de cada estado, después en proporción a la lista nominal de los municipios de cada estado y posteriormente al azar dentro de cada municipio.
Con un nivel de confianza de 95%, el error teórico es de $\pm 3.46\%$ a nivel nacional.
- Los resultados reportados son frecuencias ponderadas redondeadas a un decimal, a excepción de los cruces estadísticos que pueden no sumar 100% porque los resultados están redondeados a cero decimales.

Marco muestral y selección de la muestra.

- Se utilizó como marco de muestreo la lista nominal del IFE, actualizada al 02 de agosto de 2013.
- Muestreo estratificado, proporcional al tamaño.